

Operationsmerkblatt für Katzen & Hunde

1. Letzte Fütterung vor der Operation / Sedation

Narkosemittel können einen Brechreiz verursachen. Gleichzeitig ist in der Narkose der Schluckreflex Ihres Tieres in der Reaktion herabgesetzt. Daher **bitte kein Futter ab 20:00 Uhr am Abend vor der Operation / Sedation.**

2. Zustand nach der Narkose

Unter Umständen ist Ihr Tier noch nicht völlig aus der Narkose erwacht, wenn Sie es abholen.

- Tier in ruhigem, wenn möglich, gedämmten Raum halten. Gesteigerte Geräuschempfindlichkeit, Jaulen und Unruhe sind in der Aufwachphase möglich und kein Grund zur Beunruhigung.
- Die Pupillen können noch ein paar Stunden vergrössert sein.
- Tier auf einer Decke flach auf den Boden legen, damit es weder auskühlt noch stürzen kann.
- Befinden sich mehrere Tiere in Ihrem Haushalt, achten Sie am Operationstag bitte darauf, dass das operierte Tier nicht von den anderen angegriffen wird. Wenn nötig, trennen Sie die Tiere bis zum Morgen.
- Völlig wach scheinende Katzen haben dennoch häufig „Landeschwierigkeiten“, wenn sie vom Sofa oder Kratzbaum springen. Bitte beobachten Sie Ihr Tier und Halten es bestenfalls in einem Raum ohne Springmöglichkeiten.
- Katzen nach der Narkose mind. 1 Nacht drinnen behalten
- Hunde brauchen nach dem Heimkommen nur einen kurzen Spaziergang.

3. Fütterung nach der Narkose

Erst wenn Ihr Tier völlig wach ist, darf Wasser gereicht werden. Mit der ersten Fütterung warten Sie bitte bis am Abend oder bis zum nächsten Morgen. Bitte beginnen Sie mit einer kleinen Futtermenge, falls Erbrechen auftritt, füttern Sie erst wieder zum nächsten Fütterungszeitpunkt.

4. Haltung des Tieres

- Einige Tage nach der Operation ruhig halten (Leinenruhe, nicht zum Spielen animieren).
- Katzen bis zum Fäden ziehen im Haus halten.
- Bis zum Fäden ziehen nicht baden.

5. Wundheilung

- Die **Wunde darf nicht vom Tier beleckt oder benagt werden.** Sollte das der Fall sein, muss das Tier einen Body oder Halskragen tragen.
- Eine geringgradige, derbe Schwellung und/oder Rötung der Wundränder kann auftreten. Dies ist unbedenklich. Bei starker Schwellung (in der Regel eine unbedenkliche Ansammlung von Wundwasser) oder starker Rötung stellen Sie Ihr Tier bitte in der Praxis vor.
- **Die Fäden müssen nach ca. 12 Tagen gezogen werden.**

6. Verband

Bitte achten Sie darauf, dass der Verband

- trocken bleibt
- nicht benagt wird. Wenn ja, muss das Tier einen Halskragen tragen.
- Nach 3-5 Tagen gewechselt werden muss.

7. Medikamente / Nachbehandlung

